

Інструкція для застосування

Альпесорб

з адсорбуючою дією та антидіарейним ефектом

Капсули для перорального застосування

Медичний виріб



Склад: 1 капсула містить:

Поліметилсилісесквіоксану-Цинк™ – 370 мг (mg)

Допоміжні речовини: желатин, кальцію стеарат.

Загальна характеристика

Альпесорб з адсорбуючою дією та антидіарейним ефектом – пероральний адсорбент (ентеросорбент), до складу якого входять Поліметилсилісесквіоксану-Цинк™.

Поліметилсилісесквіоксану-Цинк™ має переважно мезопористу структуру, що створює розгалужену поверхню і завдяки ефекту капілярної конденсації адсорбує (зв'язує) екзогені та ендогені середньомолекулярні токсичні та шкідливі сполуки в кишківнику (ендотоксини, ентеротоксини, бактеріальні токсини, хімічні токсини, тощо), природним чином виводячи їх назовні, тим самим сприяючи зменшенню частоти та тривалості діареї. Адсорбція токсичних речовин з крові в кишківнику відбувається також і за рахунок ентерогепатичної циркуляції, проявляючи загальний дезінтоксикаційний ефект. Не виявляє пошкоджуючої дії на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту, виводиться в незміненому вигляді природним шляхом.

Окрім того, при внутрішньому прийомі доведено, що іони цинку скорочують тривалість і тяжкість діареї.

Завдяки активному інгредієнту Поліметилсилісесквіоксану-Цинк™, Альпесорб володіє адсорбуючою дією та антидіарейним ефектом, виявляє ентеросорбуючу дію, зменшуючи вплив токсинів на організм, сприяючи зменшенню частоти, тривалості та вираженості діареї, а також зменшенню запальних процесів слизової оболонки кишечника та сприяє покращенню моторно-евакуаторної функції.

Призначений до використання (показання)

Рекомендований для видалення екзо- та ендогенних токсинів при побутових, промислових та харчових отруєннях, діарейному синдромі, в тому числі при «діареї мандрівників» та синдромі подразненого кишківника.

Спосіб застосування та дози

Приймають внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю рідини: водою, соком або чаєм. Продукт може застосовуватись без води.

Рекомендована доза для дітей віком від 5 до 12 років – по 1 капсулі на прийом, 2-3 рази на добу; дітям старше 12 років та дорослим – по 1 капсулі на прийом, 3-4 рази на добу.

Якщо симптоми зберігаються більше 3 діб, необхідна консультація з лікарем.

Застереження при використанні

Не використовувати при гострій кишковій непрохідності та індивідуальній непереносимості компонентів продукту.

При тривалій діареї необхідно звернутися до лікаря для підтвердження діагнозу.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С, у недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Блістери, по 5 або 10 капсул у блістері; по 1 або 2 або 3 блістери у картонній коробці.

Термін придатності

3 роки. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Номер партії та дата закінчення терміну придатності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник

ТОВ «Альпен Фарма»

вул. Лугова, 8-А, смт. Гостомель, м. Ірпінь, 08290 Київська обл., Україна

тел. +38050 341-41-59



Вироблено за ліцензією:

Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія

Дотримуйтесь правил, які викладені в інструкції для застосування продукту.

Дата останнього перегляду: жовтень 2024

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Виробник
 UA.TR.098	Знак відповідності технічним регламентам
 25 °C	Температура зберігання